

comun: sin embargo, es algo mas pequeño en la realidad, y las proporciones de su estatura son muy distintas, puesto que tienen las piernas, el cuerpo y la cola mas cortas que aquella, la cabeza mucho mayor, y las alas no tan largas, ya que desplegadas no llegan á tener de punta á punta en la extension del vuelo sino cerca de seis piés. Es fácil distinguir al Buho por su figura achaparrada; por su enorme cabeza; por las anchas y profundas concavidades de sus orejas; por las dos garzotas que adornan su cabeza, y que se elevan á entrambos lados mas de dos pulgadas y media; por su pico corto, negro y retorcido, por sus grandes ojos fijos y transparentes, por sus anchas pupilas negras y rodeadas de un círculo de un color anaranjado; por su cara circuida de pelo ó mas bien de plumizo blanco, que remata en una circunferencia de pequeñas plumas rizadas; por sus uñas negras muy fuertes y retorcidas; por su cuello corto; por su plumaje rojo pardo, con manchas negras y amarillas en el dorso, y amarillas en el vientre, salpicado además de manchas negras, y con algunas fajas pardas mezcladas muy confusamente; por sus piés calzados de espeso plumon y de plumas rojizas hasta las uñas (1); y por su grito, en fin, lúgubre y espantoso *huiu, huhu, bahu, puhu*, que hace resonar en el silencio de la noche cuando todos los demás animales reposan. Entonces los despierta, los inquieta, los persigue y cautiva para matarlos, despedazarlos y llevárselos á las cavernas que le sirven de guarida; y así es que no habita sino en las rocas ó en los antiguos torreones desiertos situados en lo alto de las montañas. Raras veces desciende á las llanuras, y es muy poco inclinado á posarse en los árboles, y si en las iglesias solitarias y en los antiguos castillos. Su caza mas comun son los Lebratillos, Conejos, Topos, Turones y Ratonés, que traga enteros, y de los cuales digiere la sustancia carnosa, y vomita la piel junto con los huesos en pelotillas redondas; pero devora tambien á los Murciélagos, á las Culebras, Lagartos, Sapos y Ranas, y cria con su carne á sus polluelos: durante esta época caza con tanto afán y actividad, que su nido rebosa entonces en provisiones, que suele acumular mucho mas que ninguna otra ave de Rapiña.

Guárdanse estas aves en las pajareras á causa de su figura singular: su especie no abunda tanto en Francia como la de los demás Buhos, y no se sabe positivamente si permanecen en el país todo el año; sin embargo de que anidan allí, algunas veces en el hueco de los árboles; y mas á menudo aun en las cavernas de las rocas, ó en los agujeros de las altas y antiguas murallas. Su nido, que tendrá sobre tres piés de diámetro, se compone de pequeñas ramas secas, entretejidas de raíces flexibles, y está guarnecido de hojas en el interior: por lo comun no contiene mas que uno ó dos huevos, y muy raramente tres, cuyo color se acerca mucho al plumaje del ave, y su tamaño sucede al de los huevos de Gallina. Los polluelos son muy voraces, y sus padres y madres muy hábiles en la caza, que emprenden en el silencio de la noche, y con mucha mas ligereza de lo que debia esperarse de ser desmesurada corpulencia. Traban muchas veces combate con los Alfaneques, y salen por lo comun vencedores; haciéndose dueños de la presa que les arrebatan. Soportan la luz del dia mas fácilmente que las demás aves nocturnas: y de ahí es que salen mas temprano y antes de anochecer, el paso que se retiran muy tarde por la mañana. Véase el Buho á las veces asaltado por numerosas bandadas de Cornejas que le persiguen al vuelo, y le rodean á millares; pero sostiene entonces su choque; dá gritos mucho mas fuertes que ellas, y acaba por dispersarlas, cogiendo á menudo alguna, cuando la luz del dia va de

caída. Aunque tenga las alas mas cortas que la mayor parte de las aves altaneras, no dejan por esto de elevarse á bastante altura, sobre todo á la hora del crepúsculo; pero por lo comun vuelan bajo y á pequeñas distancias en las demás horas del dia. En la cetrería suelen servirse del Buho para atraer al Milano, y á este fin le atan una cola de Zorro, con el objeto de hacer aun mas extraordinaria su figura: así armada el ave nocturna vuela á flor de tierra, y se situa en la campiña sin detenerse en ningun árbol, mas apenas lo descubre de lejos el Milano, cuando se le acerca, no con ánimo de combatirle ó atacarle, sino tan solo como para admirarlo: y en este estado permanece el tiempo suficiente, cerca de él para que pueda tirarle el cazador, ó ser presa de las aves de Rapiña que se destacan en su persecucion. La mayor parte de los Halconeros tienen asimismo un Buho en las pajareras de cria, y lo colocan en una jaula sobre los dormitorios en lugar descubierto, á fin de que reuniéndose á su alrededor las Cornejas y Cuervos, pueda tirárseles y matar en número mayor á estas aves chillonas que inquietan mucho á los polluelos faisanes; y con el fin de no espantar á estos, se tira á las Cornejas con cerbatana.

Con respecto á las partes internas del Buho, se ha observado que tiene la lengua corta y bastante ancha, el estómago muy capaz, el ojo encerrado en una túnica ternillosa en forma de cápsula, y el cerebro cubierto de una simple membrana, mucho mas recia que las de las demás aves; las cuales á semejanza de todos los Cuadrúpedos lo tienen envuelto en dos.

Esta ave teme poco el calor y no se guarece mucho del frio, y de ahí es que se la encuentra asimismo en ambos continentes, tanto al Norte como al Mediodia, y no solo se encuentra la especie sino tambien sus variedades.

(BUFF.)

FODILO CALONG.

Strix badia (Horsf.)

Habita en la isla de Java, donde le dan el nombre de *wowo-wiwi* y *ku-longwiw*, y parece que igualmente se encuentra en la península de Malaca. Los habitantes de Java creen que el Calong gusta de introducirse en la gruta ó madriguera de los Tigres y que se aproxima gustoso á este terrible animal, posándose sin temor sobre su lomo, sin duda para devorar las larvas de los insectos que se desarrollan en el pelaje de todos los animales; pero este hecho requiere ser confirmado.

El plumaje de esta ave es por encima de un moreno castaño muy puro y ligeramente dorado: varios puntos blancos, circuidos de negro, se destacan sobre este fondo general; el cerco emplumado de la órbita y un ferreño ó cinta que adorna la frente son de un moreno claro. El collar consta de plumas blancas, cuya extremidad es de un moreno dorado. Las partes inferiores tienen una tinta isabela salpicada de manchas redondas y otras oblongas que se hallan esparcidas con profusion. Los tarsos están vestidos hasta el nacimiento de los dedos, y estos aparecen cubiertos por algunos pelos malos; el pico es amarillo, el iris moreno. La hembra tiene once pulgadas y media de longitud, y las dimensiones del macho son menores.

Segun el doctor Horsfield, esta ave nocturna, que huye de los lugares habitados, se detiene con preferencia en las selvas umbrías del canton de Pugar, y en la cadena de las altas montañas que se extienden al Sur de la ciudad de Surakarta.

(1) La hembra solo difiere del macho en que las plumas del cuerpo, de las alas y de la cola son de color mas oscuro.