

y carecen de zig-zags. Además de esto, el macho tiene sobre la parte alta del lomo y las escapulares algunas manchas grandes de un blanco bermejizo. Las partes inferiores están rayadas á lo largo y al través de moreno y negruzco. La cola y las alas tienen rayas tortuosas, morenas y de un blanco bermejizo. Una hilera de manchas blancas ocupa las escapulares y otra hilera se extiende á las orillas del ala, algunas fajas blancas se diseminan sobre las remeras. Los pelos lanosos de los tarsos y de los dedos son blancos, y la longitud total de esta ave es de nueve á diez pulgadas. La hembra tiene las partes superiores coloradas por grandes masas, y varios manchones negros y otros bermejos sobre el fondo blanco de las partes inferiores.

El Asio es bastante comun en los vergeles y en los bosques de la América septentrional, sobre todo en la Pensilvania y la Nueva Jersey. Se le encuentra en el otoño, porque durante el invierno se retira al Norte. Mr. Carlos Bonaparte cree que no difiere del Choliva del Paraguay, pero esta opinion nos parece dudosa.

(LES.)

GRANDE SCOPS.

Strix lactea (Temm.); *Nyctaeto lacteo* (Geoff.)

Se parece por su talla al gran Duque de Europa. Su

pico grande y azulado claro, está guarnecido de sedas negras y fuertes que le ocultan en parte. Las mejillas son blancas y se hallan comprendidas en el interior de un amplio semicírculo moreno negruzco. La garganta es de un blanco puro. Sobre las partes inferiores del cuerpo reina una tinta blanca sucia, sin manchas sobre las plumas de los tarsos; pero cubierta de estrías morenas, tortuosas, sutiles y como vermiculadas. La cima de la cabeza y la nuca ofrecen con corta diferencia los mismos matices y el mismo rayado ondulado. Los tonos que dominan sobre las alas y el lomo son algo mas oscuros: es una mezcla de moreno claro, y gris blanco, cuyos colores están distribuidos por rayas sutiles y por zig-zags.

Las remeras, las pennas secundarias y las timone-
ras están interrumpidas por anchas cintas leonadas, con líneas ondulosas y muy sutiles. Varias cintas morenas cuya longitud equivale á la mitad de las leonadas, alternan con estas; algunas plumas de las coberteras del medio de las alas tienen en parte sus barbas exteriores de un blanco níveo, lo que da lugar á cuatro ó cinco placas blancas sobre el reborde de las alas. Los dedos son azulados. El individuo cuya descripcion acabamos de hacer era hembra segun parece y tenia como dos piés de longitud.

Este Scops vive en la Senegambia.

Fco. Javier Mendivil