

mente en Africa y en Asia. Su pico es vigoroso, está muy comprimido, sumamente arqueado en la punta, y muy provisto de dientes, y su comisura que es hendida, está rodeada de algunos pelos duros. Sus alas son bastante cortas, con la tercera, cuarta y quinta remeras iguales y mas largas que las demás, y su cola es mediana y rectilínea.

Los tipos de este género son el *Vanga* ó *Becarda de vientre blanco* de Buff. *Lanius curvirostris*, (Gm.); *Vanga leucocephala* (Less.); y el *Cha-cher-be*, *Lanius leucocephalus* (Gm.); uno y otro importados por Sonnerat de la isla de Madagascar; pero nos limitaremos á indicarlos porque no permiten otra cosa las notas de los autores.

VANGA DESOLLADOR.

V. cruenta (Less.)

Tiene nueve pulgadas y media de longitud, y está armado de un pico vigoroso, elevado, muy comprimido lateralmente, en extremo arqueado y de narices laterales abiertas en una ancha fosa nasal. Sus alas son tan cortas que apenas pasan de la rabadilla, y tienen su primera remera de poca extension, la segunda mas larga, la tercera mas corta que la cuarta y esta, la quinta, sexta, séptima y octava, son las de mayor longitud y entre sí casi iguales. La cola es larga, ancha, redondeada en su extremidad y está compuesta de doce timoneras. Los tarsos tienen quince líneas de longitud, son gruesos y vigorosos y están terminados por tres dedos anteriores casi iguales, y mas débiles que el pulgar, que es bastante robusto y está provisto de una uña proporcionada. Tiene el pico y los tarsos negros, y las uñas de un color de asta. Lleva sobre la frente una franja de un blanco gris, que se ensancha mas en la parte anterior del ojo; cubre el párpado superior una ceja de color gris claro; y la parte alta de la cabeza, el dorso, el manto y las coberteras alares son de un gris ceniciento, y el mismo color propende á aceitunado en el lomo. Ocupa la region superior del cuerpo, partiendo desde la garganta, y extendiéndose hasta los costados y la parte media del abdomen, un rojo anaranjado con reflejos y tintas sanguíneas bastante oscuro en la delantera del cuello. El bajo vientre y las coberteras inferiores, son de un amarillo puro, y las alas en la parte interior, son pajizas, y el reborde de la espalda es de un negro mate. De este último color están teñidas las dos primeras remeras, y las demás son todas de un gris pizarroso en la parte exterior y pardas en la interior, ó hablando con mas propiedad, en sus barbas internas. Las grandes coberteras alares son anchas, están escalonadas, teñidas de un negro vivo, y festonadas de un amarillo pálido; la cola es de un gris pizarroso en la faz superior, está atravesada por una ancha franja circular negra, terminada por un reborde amarillo de canario, participando en la faz inferior de los mismos colores, aunque menos vivos y sin resaltar con la misma intencion.

Habita este hermoso volátil en el cabo de Buena Esperanza, ó mas bien en el cabo Coast, en la costa occidental de Africa.

SUB-GÉNERO LAGRAYANO.

Ocypterus (Cuv.); *Artamus* (Vieill.); *Leptopterus* (Horsf. y Vig.); *Lanius*, *tardus* (Lath.)

TIENEN un pico mediano, redondeado, puntiagudo, abultado por todas partes y lisos los bordes de las mandíbulas; las piernas son cortas, las alas exceden en longitud á la cola, son puntiagudas y tienen la primera y segunda remera mas largas que las demás; la cola es mediana, y sus pennas iguales en extension. Estas aves habitan en las islas indianas del Este,

vuelan sin cesar persiguiendo á los Insectos de que se alimentan; tienen el valor de las Picazas silvestres, y se deciden á pelear con los Cuervos.

LAGRAYANO DE VIENTRE BLANCO.

Ocypterus albiventer (Val.); *Lanius leucorhynchos et dominicanus* (Gm.)

Habita la isla de Luzon y la Nueva Caledonia.

La cabeza y lomo son cenicientos; el vientre blanco; el pico azulado.

Es enemigo del Cuervo, y aunque es mas pequeño, le provoca y persigue hasta obligarle á huir.

SUB-GÉNERO CASICAN.

Barita (Cuv.); *Cracticus* (Vieill.); *Corvus* (Less.)

TIENEN un pico robusto y grande, que corta las plumas de la frente por una escotadura circular; en la faz superior es redondeado ó plano, está comprimido sobre las partes laterales, y su punta es escotada y ganchosa; tiene las narices abiertas en hendidura lineal, y las alas, que son de mediana extension, tienen la cuarta y quinta remera mas largas que las demás.

Los Casicanes viven exclusivamente en el Asia y en la Australia, y son grandes Picazas silvestres de formas macizas y obesas, en extremo alborotadoras, y que se alimentan de Escarabajos y otros Insectos; y segun se dice, tambien de tiernas avecillas.

Estas aves tienen por sus costumbres muchos puntos de contacto con los Cuervos; sus movimientos son bruscos y andan como á saltitos. No desdennan ningun alimento que se les ofrezca, á lo menos cuando están privados de libertad, y lo mismo comen carne cruda que semillas y grandes Insectos.

Buffon solo ha conocido de este grupo el

CASICAN MEZCLADO.

Barita varia (Tem.); *Coracias varia* (Lath.)

Dió este nombre Buffon á un ave que tiene semejanzas con los *Caciques* y los *Tucanos*.

Es delgado; de unas quince pulgadas de largo, y se le tiene por Frugívoro.

CASICAN DESPERTADOR.

B. strepera (Tem.); *Gran Calíbeo* (Levaill. Shaw.); *Coracias strepera* (Lath.)

Habita la isla de Norfolk. Es negro con un lunar blanco sobre el ala, y tiene del mismo color el bajo vientre y el nacimiento de la cola. Los individuos jóvenes de esta especie, son bermejizos en la region inferior.

CASICAN FLAUTISTA.

B. tibicen (Shaw. Quoy y Gem.); *Coracias tibicen* (Lath.)

Es de la Nueva Gales meridional; negro como el precedente; con la nuca, el bajo vientre y los guiones blancos, y del mismo color la cola, cuya extremidad es negra. La hembra es de un gris morenuzco.

CASICAN DESTRUCTOR.

B. destructor (Tem.)

Es tambien de la Nueva Holanda. Tiene la region superior de un ceniciento leonado y blanco en lo inferior; la cabeza, las mejillas, las remeras y las timoneras de color negro, las primeras estriadas de blanco y