

negro, como las piernas; el iris es de un encarnado de coral; los tarsos están provistos de anchas escamas; y los dedos, que son robustos, están provistos de uñas comprimidas, aplastadas en su parte superior y arqueadas.

El Calíbeo vive solitario en los bosques de la Nueva Guinea, y sus costumbres nos parecen ser muy análogas á las de los Cuervos. Nosotros los hemos visto muchas veces encaramados sobre los árboles mas gigantes, donde buscan los frutos de que se alimentan.

SUB-GÉNERO BECARDA.

Psaris (Cuv.); *Tityra* (Vieill.); *Pachyrhynchus* (Spi.—Bull.)

TIENE un pico cónico muy grueso, redondeado en toda su extension, escotado y puntiagudo en su extremidad, con la comisura cubierta de sedas; al redor del ojo se observa un cerco desnudo; las alas, que son de mediana longitud y de forma puntiaguda, tienen la primera y segunda remera mas largas que las demás, y su cola es mediana y rectilínea. Son aves de la América Meridional.

BECARDA GRIS.

Psaris Cayanus (Swainson.); *Lanius cayanus* (Gem.)
Picaza silvestre gris y *Picaza silvestre manchada de Cayena* (Buff.); *Tityrea cirerea* (Vieill.)

Tiene el plumaje gris ceniciento; la cabeza, las alas y la cola negras; el cuello gris ceniza claro.

Habita en la Guayana.

SUB-GÉNERO CHUCARI.

Grancalus (Cuv.); *Coracina* (Vieill.)

TIENEN algunos puntos de contacto con los Rolos, por la comisura del pico, hendida y dirigida hácia abajo. Este es de mediana longitud, convexo, de arista viva, bastante ancho en su base, provisto de dientes y arqueado en su punta, con las fosas nasales en forma de peine; las alas son largas y puntiagudas, con la tercer remera de mayor longitud; son sus tarsos bastante cortos, y su cola mediana y rectilínea. Estas aves se encuentran en la India y en las islas del mar del Sur.

CHUCARI DE NUEVA GUINEA.

El color dominante de esta ave, que no conocemos mas que exteriormente, es gris-ceniciento-oscuro en la parte superior, mas claro en la inferior y va degradando hasta llegar á ser casi blanco debajo del vientre y sus alrededores. Las solas excepciones que deben hacerse en esta especie de uniformidad de plumaje son una faja negra que rodea el origen del pico, prolongándose hasta los ojos, y las grandes remeras que son de un pardo negruzco.

Las narices del Chucari están enteramente cubiertas como las del Grajo, y entre sus picos no hay mas diferencia sino que no tiene la arista de la pieza superior redondeada, sino angulosa como el cuello desnudo. Aseméjase tambien á este en las proporciones relativas de las alas, que no pasan de la mitad de la cola, en la pequeñez de los pies, y en la cortedad de las uñas; de suerte que es preciso colocarlo en el mismo lugar que hemos señalado al anterior. Su longitud, desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola, es de unas trece pulgadas.

SUB-GÉNERO BETILO.

Piluriones (Les.); *Bethylus* (Cuv.); *Cissopsis* (Vieill.)

TIENEN el pico grueso y corto, abultado por todas partes y ligeramente comprimido hácia su extremidad. Sus alas son cortas; pero la cola, que es larga, consta de timoneras escalonadas.

BETILO PICAZA.

Urraca pega-reborda (Levaill.); *Cissapis bicolor* (Vieill.)
Lanius leverianus (Shaw.); *Picatus* (Lath.); *Tanagra* (Illig.); *Corvus collurio* (Daudin. Wied. Deit.)

Es la única especie de este género, y los naturalistas le han confundido incluyéndola unas veces entre las Pegas-rebordadas y otras veces entre los Bataras y los Drongos. Esta ave, oriunda del Brasil, tiene una longitud de nueve pulgadas, y es notable por los dos colores de su plumaje, que son un negro lustroso y un blanco de nieve, por lo cual se ha comparado á la Picaza de Europa.

Ignóranse sus costumbres, y se asegura que tambien existe en la Guayana.

SUB-GÉNERO

HALCONCILLO.

Falcunculus (Vieill.)

TIENEN el pico corto, de bastante elevacion y muy comprimido en las partes laterales; la primera remera es en ellos mas larga que las restantes, y las plumas de la cabeza son muy flexibles. Estos volátiles viven en la Nueva Holanda, y solo se conocen dos especies.

HALCONCILLO DE CASCO.

Picaza silvestre de casco; *Falcunculus frontatus* (Vieill.—Vig.—Horsf.); *Lanius frontatus* (Temm.)

En la parte superior del cuerpo es de un color oliváceo, amarillo en la inferior, y ceniciento sobre las alas y la cola, con la cabeza y el cuello mezclado de negro y blanco nevado: tiene moño.

SUB-GÉNERO PARDALOTE.

Pardalotus (Vieill.)

TIENE el pico muy corto, bastante robusto, cónico obtuso, convexo, comprimido en los lados, con la mandíbula superior un poco arqueada y delicadamente escotada en la punta. Las narices son pequeñas, basales desnudas, y están abiertas en una membrana; la cola es corta, igual y con la primera ó segunda de las remeras mas larga que las demás: los tarsos son mediocres.

Los Pardalotes son unas aves de pequeña talla las que Latham no distinguia de los Manakines; su lugar se halla lejos de estar exactamente fijado, aunque sin embargo tienen bastante analogía por las costumbres y por las formas rechonchas del cuerpo con los Paros.

Buffon no ha conocido ninguna especie de este género.

PARDALOTE ADORNADO.

Habita en la Nueva Holanda.

Tiene la parte mas elevada de la cabeza, las alas y