

El *Petrelo moreno* ó *negro de cuello blanco* se halla generalmente en el intervalo de los 35 á 43° de longitud Sur, y en las inmediaciones de los cabos de Buena Esperanza y de Diemen.

*Petrelo antártico de Cook*. Hacia los 40° de latitud Sur se ha visto un *Petrelo* de la magnitud de *Tablero de Damas*, el cual se parece por el conjunto de sus formas. El color de las plumas del abdomen es de un blanco satinado y el de la parte superior del cuerpo y la anterior del cuello hasta el pecho, es de un negro morenusco.

Hemos observado que esta ave del mismo modo que los demás *Petrelos* y *Albatroses* tiene la costumbre de poner la extremidad de sus alas en contacto con el agua, barriendo ó rozando la superficie del mar, y elevándose en seguida para cernirse de un modo continuo, por mas que en su vuelo sea rápido y sin movimiento perceptible de las alas. Por medio de esta accion parece que realmente toca al mar, como si lo hiciese con intencion deliberada ¿será acaso que se proponga saber cual es la distancia á que se halla del líquido? ¿ó tal vez la agitacion del agua, con la extremidad del ala, servirá de estímulo á los Peces para que asciendan á la superficie de ella ó para obligarles á que huyan con temor con el fin de que sean mas fácilmente apresados por el ave Cazadora?

Desde el 45° de latitud Sur, hasta el 60°, se encuentra el *Petrelo gigante* ó *Quebranta-huesos*, fácil de confundir con el *Albatros* cuando se ve desde lejos. Sus costumbres le fijan en medio de las altas latitudes del Sur y de las tempestades del cabo de Hornos. Frecuenta tambien las recaladas de las islas Maluinas y de la Tierra de los Estados. Un individuo de esta especie conseguí matar en la bahía de la Soledad, donde son bastante comunes.

El intervalo que media entre los grados 50 y 60 de latitud está frecuentado por un *Petrelo*, cuya estatura iguala á la del *Tablero de Damas*, aunque es mucho mas esbelto en sus formas. El plumaje de esta especie, es, sobre el cuello de un color ceniciento azulado claro, y como abrigado; la parte inferior del cuello, vientre y rabadilla es de un blanco satinado: el pico es azulado con algunas tintas purpúreas que tambien se notan en las patas. Estúpida y sobradamente confiada esta ave, se deja prender fácilmente por medio de redes que se sitúan sobre el agua á la popa de la embarcacion y generalmente queda presa por las alas.

Por los 52°, pero especialmente por los 55° de latitud Sur, en los mares de la Tierra de Fuego y hasta los 60°, nos acompañó en nuestra navegacion el lindo *Petrelo azul* descrito por Forster en el segundo viaje de Cook. Esta ave cuya talla es dos veces mayor que la del *Petrelo pelágico*, tiene de notable el color mate de su librea. El lomo y la parte superior de la cabeza son de un gris azulado, las alas muy sutiles y de color gris morenusco, un *chevron* de color mas oscuro cruza el lomo y las alas. Los costados del cuello y parte de la cabeza, ostentan plumas teñidas de gris negruzco, el vientre y la garganta, son de un blanco niveo; una línea blanca atraviesa por encima del ojo; las plumas de la cola son cenicientas y su borde es negruzco; la membrana de los piés es blanca, y estos son negros; el pico es mas ancho por su base que el de los demás *Petrelos*, y este carácter hizo que MM. de Lacepede y Cuvier adoptasen el sub-género *Prior*.

Hacia los 60° de latitud Sur, aunque en pequeño número, hemos visto un *Petrelo* cuya talla es un tercio menor que la del *Petrelo gigante*. Sus piés negros están ámpliamente palmeados; su pico de color moreno parece mas fuertemente encorvado que el de las demás especies. Todo su plumaje es de color gris uniforme, mas intenso y mas sombrío en la cabeza y las coberteras de las alas; estas son afiladas y muy largas, y la cola es cuadrada por lo regular. Esta especie vuela con rapidez, y al modo de las demás aves de

este género, es decir, como esfloreciendo y palpando la superficie del mar.

LOS ALBATROSES. Despues de los *Petrelos*, siguen los *Albatroses* que entre las aves Pelagianas que vuelan con facilidad, son las de mayor tamaño. La talla privilegiada de todas estas especies guarda poca analogía con la rapidez y la duracion de un vuelo prolongado, y esto hizo que se les diese el nombre *Navios de guerra* ó *Carneros del Cabo*. Esta ave, es la que mas se aleja de las costas, habita generalmente en las latitudes extra-tropicales, y principalmente en los mares que bañan los tres grandes cabos que avanzan hacia el Sur, es donde se observa con mas frecuencia. Por mucho tiempo se ha creido, que esencialmente peculiar al hemisferio del Sur, no se hallaba en el boreal, y sin embargo Mr. de Roque Jenille en su viaje de circunnavegacion, asegura haber matado un considerable número de ellos en los mares de la costa Noroeste de la América.

Vimos algunos *Albatroses* desde el 20° de latitud Sur; pero los paralelos que prefieren, son los que se hallan en el intervalo de 35 á 40°. Estas aves nunca parecen abundar mas que durante el mal tiempo: así es que en los golpes de viento, sobre todo en el *Pámpero* que recibimos no lejos del rio de la Plata en el canal de Patagonia, se burlaban de la tempestad y esflorecian balanceándose con molicie, las olas densas é irritadas de estos mares peligrosos.

Creemos que hay cuatro especies de *Albatroses* que fácilmente se distinguen entre las demás de su clase. Las tres primeras se hallan mas habitualmente hacia los 42° de latitud meridional, y la cuarta especie parece preferir los grados 50 y 60. El *Albatros Comun*, el de *Charreteras*, el *Clororinco* y el *Fuliginoso*.

LOS FAETONTES. Las dos especies conocidas de *Faetonte* *Paja en la cola* ó *Rabijunco* son, susceptibles de ser colocadas en la division artificial y puramente geográfica que hemos establecido, aunque puede decirse que su permanencia habitual en la zona tórrida, no les permite alejarse mucho de la tierra, y que por consiguiente, en rigor y casi cada noche pueden ganar las islas ó las encumbradas rocas que le sirven de refugio. No obstante, nos acaeció con tanta frecuencia encontrar estas aves en los espacios mas distantes de la costa, oírlos sobre nuestras cabezas en ese tiempo de calma, en esas noches deliciosas de los trópicos, que debemos considerarlas como las aves de alta mar que parecen anunciar ó ser las mensajeras de las regiones del sol, tal como lo indica el nombre poético que les puso la imaginacion fecunda de Linneo.

El *Faetonte* se separa muchas veces de los límites naturales que le han sido prescriptos, á consecuencia de los huracanes, que son muy comunes en la zona ecuatorial: así es, que mas de una vez le hemos visto hacia los 30° de latitud Sur. El *Rabijunco comun* que es el mas grande del género, parece hallarse confinado en el océano Atlántico y detenerse en los mares de la India. Por el contrario, el de manchas rojas (*Phaeton Phænicurus*, L.) parece pertenecer mas particularmente al grande océano Equinocial; sin embargo, las dos especies existen casi por igual en las islas de Francia y de Borbon. El vuelo del *Faetonte*, es lento, apacible, bate las alas con frecuencia y á veces interrumpe su vuelo por una especie de caídas ó movimientos bruscos. Gusta de aproximarse á las embarcaciones y las reconoce desde muy cerca.

Ahora nos resta hablar de las aves Nadadoras.

El navegante suele encontrar á considerable distancia de la costas, ciertas aves cuya organizacion para el vuelo es extremadamente mala, que viven en medio del mar y solo frecuentan las riberas en épocas determinadas, que es cuando hacen su postura, se dedican á la incubacion y alimentan á sus polluelos. Habitantes de las latitudes australes, anidan sobre las extremidades tempestuosas del Sur de la América, de