

CLASIFICACION.

HASTA Lineo los métodos de clasificacion puede decirse que fueron arbitrarios; aun cuando se conociese desde Aristóteles y Plinio qué caracteres eran los de mas importancia en la organizacion de las aves. Despues de aquel gran naturalista, ha habido muchos ornitólogos; pero casi no han hecho mas que perfeccionar su obra. Cuvier mismo es quien ha venido á darle su mayor solidez, enlazando en su *Regne animal* los antiguos conocimientos con las nuevas investigaciones. He aquí la

TABLA SISTEMATICA

DE LOS

ORDENES, FAMILIAS, GENEROS Y SUB-GENEROS.

ESTABLECIDOS POR CUVIER.

Piernas enteramente cubiertas de plumas.

Garras encorvadas, agudas, contráctiles. ORDEN 1 AVES DE RAPIÑA.

Dedos no configurados para desgarrar.

Dos dedos hácia adelante, y uno (rara vez dos) hácia atrás. 3 TREPADORAS.

Un solo dedo posterior, á veces ninguno.

Dedos reunidos completamente por membranas. 6 PALMÍPEDAS.

Dedos libres, o parcialmente libres.

Dedo externo mas ó menos incompletamente reunido con el de en medio; uñas encorvadas. 2 PÁJAROS.

Dedos anteriores reunidos en su base por una membrana, ó libres y solamente guarnecidos; uñas poco arqueadas. 4 GALLINÁCEAS.

Piernas desnudas en la parte baja; tarsos muy elevados. 5 ZANCUDAS.

Estos órdenes los distribuye así en familias, géneros y sub-géneros.

ÓRDEN DE LAS AVES DE RAPIÑA (*Accipitres*, de Lineo).

Animales carnívoros, de pico y garras encorvados y agudos; narices abiertas en una membrana que cubre toda la base del pico y que se llama cera.

FAMILIA DE LAS AVES DE RAPIÑA DIURNAS.

Ojos laterales; cabeza y cuello proporcionado.

GÉNERO BUITRE (*Vultur*, de Lineo).

Sub-géneros: *Buitres*, *Catartos*, *Pesinonópteros*.

Ojos salientes, pico prolongado, encorvado solo por la extremidad: cabeza desnuda, cuello desnudo ó veloso.

GÉNERO GRIFO (*Gypaetos*, de Storr).

Ojos salientes, pico recto por su base, encorvado y levantado por el extremo; cabeza y cuello con plumas.

Fco. Javier Mendivil