

GÉNERO OSTRERO (*Hæmatopus*, de Lineo).

Pico mas largo que el de los Pluviales, recto, puntiagudo, bastante fuerte para abrir las conchas bivalbas; tarsos de tres dedos, reticulados.

GÉNERO CORREDOR (*Tachydromus*, de Illiger).

Pico mas endeble, igualmente cónico, arqueado, sin surco y medianamente hendido; alas mas cortas; piernas mas altas; tarsos de tres dedos sin palmura y sin pulgar.

GÉNERO CARIAMA (*Mierodactylus*, de Geoffroy).

Pico mas largo, mas encorvado, y abierto hasta el ojo; piernas escudadas y muy altas, terminadas por dedos cortos, un poco palmeados, y por un pulgar que no llega á la tierra.

FAMILIA DE LAS ZANCUDAS CULTRIROSTRAS.

Pico grueso, largo y fuerte, generalmente cortante y puntiagudo.

GÉNERO GRULLA (*Grus*, de Cuvier).

Pico recto, poco hendido; fosa membranosa de las narices ancha y cóncava ocupando cerca de la mitad de su longitud; piernas escamosas, dedos medianos, los externos poco palmeados, y el pulgar tocando apenas en tierra.

Sub-géneros: el *Agami* ó *ave Trompeta*, la *Doncella de Numidia*, la *Grulla comun*, los *Curlanes*, los *Caurales*.

GÉNERO SAVACÚ (*Cancroma*, de Lineo).

Dedos mas grandes; pico mas fuerte, muy ancho de derecha á izquierda, y formado como de dos cucharas aplicadas una contra otra; mandíbulas fuertes y cortantes, la superior armada de un diente agudo á cada lado de su punta, narices situadas hácia su base, y prolongadas en dos surcos paralelos. Piés de cuatro dedos, largos y casi desnudos de membranas.

GÉNERO GARZA (*Ardea*, de Cuvier).

Pico hendido hasta debajo de los ojos, una pequeña fosa nasal prolongada en un surco hasta muy cerca de la punta, uña del dedo de en medio cortante y festonada en el borde interno; piernas escamosas; dedos bastante largos con palmura externa notable.

GÉNERO CIGÜEÑA (*Ciconia*, de Cuvier).

Pico grueso, medianamente hendido, sin fosa ni surco; narices situadas en el dorso, cerca de la base; lengua muy corta, ojos rodeados de un espacio desnudo; piés largos, reticulados; dedos anteriores reunidos por una membrana hasta la primera articulacion; mandíbulas que producen un chasquido al chocar una con otra.

GÉNERO JABIRU (*Mycteria*, de Lineo).

Pico de abertura mediana, narices, tarsos, palmura de los dedos como en las Cigüeñas; pico ligeramente encorvado hácia arriba.

GÉNERO UMBRETA (*Scopus*, de Brisson).

No se distingue de las Cigüeñas sino por un pico comprimido de arista cortante, engruesado por la base; narices prolongadas en un surco que corre, paralelamente á la arista, hasta al extremo, el cual es un poco encorvado.

GÉNERO PICO-ABIERTO (*Anastomus*, de Illiger).

No se diferencia de las Cigüeñas sino por las dos mandíbulas que se unen solamente por la base y por la punta, dejando en el medio un espacio vacío.

GÉNERO DROMO (*Dromas*, de Paikull).

No difiere del de los Pico-abiertos sino por el pico comprimido, un poco grueso por su base en la parte inferior, narices ovales, y los bordes del pico se unen completamente.

GÉNERO TÁNTALO (*Tantalus*, de Lineo).

Piés, narices y pico de las Cigüeñas; pero el dorso del pico redondeado, la punta encorvada hácia abajo, y ligeramente escotada de cada lado; parte de la cabeza desnuda de plumas.

GÉNERO ESPÁTULA (*Platalea*, de Lineo).

Estructura de las Cigüeñas, pero pico largo, ensanchado hácia la punta y aplanado en forma de espátula; dos surcos ligeros que parten de la base y se extienden hasta el extremo, sin ser paralelos á los bordes.

FAMILIA DE LAS ZANCUDAS LONGIROSTRAS.

Pico endeble, largo, delicado, propio para escarbar en el fango, y buscar en él los Gusanos é Insectos pequeños.

GÉNERO BECADA (*Scolopax*, de Lineo).

Pico recto ó arqueado. Piés poco ó nada palmeados.

Sub-géneros: los *Ibis*, los *Chorlitos*, las *Becadas*, los *Rinqueos*, los *Bargas*, las *Maubecas*, los *Sanderling*, las *Alondras de Mar*, los *Cocorlis*, los *Falcinelos*, los *Combatientes*, los *Eurinatorcos*, los *Falaropos*, los *Revuelve-piedras*, los *Caballeros*, los *Lobipedos*, los *Zancudos*.

Fco. Javier Mendivil