

estrechas, corvas, dolabriformes, y debajo de ellas existe un espeso vello leonado y blanco. La cola es recortada y muchas veces obtusa en su extremidad: los tarsos son morenos y robustos; las uñas largas, ganchosas y de color de cuerno.

Cuando es joven esta ave es de notar el espeso vello blanquecino que la cubre. Al salir del nido, sus plumas son de moreno claro con bordes bermejos, y las de la parte baja del cuerpo todavía no están desarrolladas.

Habita en las rocas escarpadas del país de los namaquenses, en el Africa austral y vive en bandadas numerosas. Los colonos holandeses del Cabo le llaman *Ave negra de carroña* (Charogue) y los namanqueses *Ghaip*. Este Buitre anida en las requiebajaduras de las rocas donde deposita dos ó tres huevos blancos que la hembra incuba, mientras que el macho se queda de centinela á la boca de su guarida. Por el mes de enero es cuando los pequeños buitres rompen el cascaron.

BUITRE DE PONDICHERY.

Vultur ponticerianus (Latham).

Es comun en Bengala, en Java y en Sumatra. He aquí lo que dice Temminck: «Los compiladores han hecho nacer algunas dudas en cuanto á la diferencia que existe entre el *gran Buitre-real* de Pondichery, descrito y copiado por Sonnerat, y el Buitre auricular (Oricón) que figura entre las aves de Africa, de Mr. Le-Vaillant, dos especies muy distintas de rapaces que difieren por su talla, su forma y su plumaje. El auricular, de la talla del Pelicano, es el mas vigoroso entre todas las aves innobles de rapiña, excede en magnitud al Catarto-condor, mientras que el Buitre-real no es mas grande que un ganso.

A esta dilerencia que existe entre la talla de ambos individuos, pueden añadirse otros puntos de semejanza que dependen de las formas: el mas caracterizado se halla en la especie de membrana floja, que en una y otra especie está situada á los lados del cuello. En el auricular, la membrana rodea toda la parte posterior del meato auditivo, donde forma una especie de concha ó cuenca y despues se extiende, disminuyendo en latitud, sobre lo restante de la parte desnuda del cuello.

En el Buitre-real, la membrana está formada por una pequeña papada que toma su origen como á una pulgada de distancia debajo del meato auditivo, y toma mayor amplitud redondeándose en su parte media. Estas membranas, mas ó menos anchas mas ó menos flojas ó flotantes, son apéndices que constantemente se observan en muchas especies de Buitres y de Catartos; son de una naturaleza idéntica á las papadas de los Pavos y los Penélopes, y consisten en prolongaciones muy finas de piel, reunidas por tegumentos sumamente delgados. El Buitre-real tiene las alas algo mas cortas que la cola, mientras que el auricular las tiene mas largas.

El adulto del Buitre-real tiene toda la cabeza y el cuello desnudos. Estas partes están coloreadas de una tinta color de carne, y la piel aparece sembrada de algunos pelos bastante cortos y ralos; la pequeña papada ó apéndice membranoso que se ve á cada lado del cuello, está igualmente desnudo: no así el buche que está cubierto de un vello corto y moreno, si bien alrededor de esta parte se descubre un vello blanco y mas largo: toda la parte superior del nacimiento del cuello está cercada por una gorguera de plumas cortas y redondeadas que se extienden por los costados del mismo órgano. El plumaje está generalmente colorado de tinta morena ó negra. Las remeras son de este último color; el pico de un negro azulado, la cera amarillenta y los piés de un amarillo oscuro: longitud dos piés y cinco pulgadas.

Los pequeñuelos tienen la cabeza y el cuello mas ó menos abundantemente guarnecidos de un vello corto, pero los adultos tienen desnudas estas mismas partes. Los pequeños copos de vello que cubren el cuello de los Buitres y Catartos, siempre dan indicio de que aquella librea pertenece á un individuo joven; otro indicio que revela la poca edad, se obtiene á vista del plumaje mas ó menos variado; pues el de los adultos, en todas las especies, está constantemente colorado en grandes masas.

Esta especie tiene, sin duda, las costumbres de sus congéneros.

Los malabares han hecho de ella un ídolo, que adoran; pero no debe este honor á su tamaño y á su fuerza, sino á la hermosura de su pluma; pues hay que confesar que es una de las mas hermosas aves del género de las de Rapiña.

(BUFFON).

BUITRE CON CASQUETE.

Vultur galericulatus. (Temminck); *V. occipitalis* (Herschell).

Como solo conocemos esta especie por la descripción que de ella hace Mr. Temminck, reproduciremos lo que dice este naturalista: «El macho adulto de este Buitre es de un color moreno negruzco, bastante uniforme. Las plumas secundarias de las alas son cenicientas, y las que se hallan mas exteriores tienen un matiz mas sombrío que las mas próximas; las últimas son casi blancas, y las coberteras de las alas varían de color segun la edad, y por lo mismo son morenas, leonadas y blanquecinas, como en nuestros buitres de Europa; el cuello, el lomo, los escapulares y el vientre son de un blanco puro, mezclado con frecuencia de algunas plumas leonadas.

«Los de edad proveyta tienen blanco el abdomen, y lo mismo las coberteras de debajo de la cola; la cera del pico es azul, y la parte desnuda de la cabeza y del cuello tiene tintas rojas, rosadas ó blanquecinas, que son mas vivas, ó mas pálidas, segun la sangre que circula en los vasos que sirven para colorar la piel. Como los jóvenes tienen estas partes cubiertas de un vello muy fino, no se percibe en ellos una coloracion distinta. El pico es amarillo, y los piés tienen un color de carne en los adultos, y un color de ceniza en los individuos jóvenes.»

El Museo de los Países-Bajos posee una hembra, cuya librea, propia de la juventud, está mezclada con plumas morenas y negras, propias del estado adulto. Las partes de la cabeza y del cuello todavía conservan algunos vestigios de mechones vellosos; las superiores del plumaje están irregularmente sembradas de plumas morenas, sobre un fondo leonado blanquecino; las alas son morenas, con algunas manchas blancas; el vello de las piernas tambien es moreno. La longitud del macho es de dos piés y cinco pulgadas, y la longitud total de la hembra excede de tres piés. Una he visto viva en Londres que tenia iguales dimensiones.

Este buitre habita en los países occidentales y septentrionales del Africa.

BUITRE DE LAS INDIAS.

Vultur indicus (Forts); *Changun* (Vulg.)

El pico del Changun es muy robusto, convexo, á partir desde una prominencia frontal, bastante saliente, y terminado en punta ganchosa y muy encorvada. Los bordes de la mandíbula superior son delgados, están afilados y repulgados hácia su parte media. La mandíbula inferior es convexa por debajo, estriada y de bordes muy cortantes. La comisura es membranosa, así como el intervalo que existe entre las dos ra-