

su talla poco mas ó menos igual á la de un mirlo. Su pico es negro; su cera y sus tarsos son amarillos; la cabeza y el cuello de un gris ceniciento; el manto rojo moreno; el vientre, del mismo modo que las partes inferiores, de un bermejo vinoso ondulado y sin manchas. La cola es redondeada, blanquecina por encima y rayada de moreno. Los tarsos son delgados. Las formas corporales muy esbeltas. La hembra es de un amarillento sucio, flameado de moreno.

La Crecreleta es peculiar de las regiones meridionales. Está sedentaria en Morea, donde vive como la Crecerela, en las torres elevadas y los antiguos edificios. Mr. Saví abserva que únicamente de cuando en cuando se presenta en Italia y muy pocas veces en Toscana. Su aparicion á orillas del Adriático es tambien accidental, y solo parece en las islas del Mediterráneo cuando las nubes de Langostas se ven en la precision de abandonar el Africa, atravesando dicho mar en la estacion seca, para diseminarse por las llanuras cultivadas de la Italia.

Como la Crecreleta se alimenta casi exclusivamente de Langostas, solo visita la parte meridional de la Europa en persecucion de estos Insectos, y cuando desaparecen, tambien ella abandona el país. Mr. Cantraine la vió abundantemente en Toscana durante los meses de mayo y junio de 1827. Mr. Bory de San Vicente, que mató muchos individuos en Morea, donde esta rapaz se detiene con preferencia, dice que se alimenta con mas especialidad de Lagartos y otros pequeños Reptiles é Insectos.

La Crecreleta se presenta igualmente en Nápoles, en Sicilia, en Cerdeña, en España, en Persia y en Bengala, de donde Mr. Belanger trajo algunos individuos.

SEVERO ALDROVANDINO.

Quingseng.

Es de la talla del Roquero de Europa, y tambien se le parece en las formas; pero los colores del plumaje son diferentes, y el cerco de los ojos está desnudo. La cima de la cabeza, la nuca y las mejillas son de un negro ligeramente teñido de color aplomado. El manto, el lomo, las alas, la rabadilla y las dos pennas del centro de la cola, son de un color apizarrado ó azul negruzco. Una raya sutil y negra recorre en sentido longitudinal el tronco de cada una de las plumas. Las remeras son de un negro fuerte, y sobre las barbas inferiores ofrecen grandes manchas bermejas. La garganta es de un bermejo muy claro. Todas las demás partes inferiores y las interiores del ala son de un magnifico rojo bayo. La desnudez del cerco palpebral aparece de color amarillo, que es el que tambien se observa en la cera y los piés, siendo sus dimensiones totales de diez pulgadas con seis líneas. Habita este Halcon en la isla de Java. (LESS.)

HALCON ANARANJADO.

Es de una talla igual á la del Aguilucho comun. Tiene el pico y los piés de color de plomo, el cuerpo negruzco, el lomo y el nacimiento de la cola, con fajas blanquecinas interrumpidas, el pecho leonado, los muslos ferruginosos, y varias manchas redondeadas y blanquecinas se extienden sobre el cuello; el vientre es negruzco, con rayas mas claras; los tarsos son largos y muy delgados. Latham da á este ave quince pulgadas de longitud, y reconoce dos variedades, que son, la primera el Halcon de garganta blanca y el de cola bermeja. La primera, cuya talla es mas pequeña, pues solo cuenta diez pulgadas de longitud, tiene el rayado del cuerpo menos perceptible, la garganta blanca y el cuello anaranjado. La otra tiene los tarsos morenuzcos, el cuerpo negro teñido de azul, por

encima con rayas azuladas, el bajo vientre y los muslos bermejos y rayados de blanco, la garganta y el cuello de un hermoso bermejo puro, con una mancha blanca en su centro. Este Halcon habita en el Surinam (Guayana holandesa).

Halcon de garganta blanca.

Falco deiroleucus (Temm.); *F. thoracicus* (Illig.).

Parece ser la primera variedad del Halcon anaranjado de Latham. Mr. Temminck le distingue como especie, segun lo acreditan los detalles minuciosos de comparacion acumulados en el texto que acompaña á la figura que ha dado acerca de lo cual se expresa en los siguientes terminos. «La diferencia que existe en la magnitud, debe servir de primer medio de distincion. El Halcon de garganta blanca tiene la talla algo menor que el Halcon peregrino de Europa, mientras que las proporciones del anaranjado son iguales á las del Esmerejon. Los tarsos del primero se parecen mas á los del Peregrino, y los del segundo á los piés del Aguilucho.

«En el Halcon anaranjado adulto se observan sutiles cintas transversales, sobre las plumas negras del vientre; y en el Halcon de garganta blanca están reemplazadas por manchas bermejas, distribuidas de un modo mas ó menos irregular. Los colores del plumaje son tan iguales en una y otra especie y su distribucion es tan igual, bajo este concepto, que en el plumaje del adulto no es posible hallar ninguna otra semejanza mas que la de la extension mas ó menos notable del color negro rayado de bermejo y blanquecino.

«En el Halcon de garganta blanca, el negro no se extiende mas allá del vientre, y la region torácica es bermeja. En el Halcon anaranjado, el negro, mas ó menos rayado de blanco y de bermejo, cubre esta region, y la tinta bermeja se extiende hasta llegar á la parte anterior del cuello. La hembra del primero tiene una longitud total de diez y seis pulgadas, y el macho catorce, mientras que las mayores dimensiones del anaranjado no exceden de diez á doce pulgadas.

En suma, el Halcon de garganta blanca nos parece una ligera variedad de la especie anterior: se halla en el Brasil.

Un negro perfecto forma el color dominante de todas las partes superiores del cuerpo, de las alas y de la cola, de las mejillas, del vientre y de los costados. Un gris azulado, esparcido sobre la extremidad de cada una de las plumas de estas regiones hace dominar un matiz brillante y azulado sobre esta masa negra. Cuéntanse cinco ó seis hileras de manchas que se distribuyen en fajas interrumpidas, sobre las pennas de la cola; una hilera de manchas bermejizas en la hembra y blanquecinas en el macho, se percibe sobre las barbas interiores de las remeras. El vientre está rayado de fajas bermejas bastante separadas y mas ó menos interrumpidas; la garganta y la parte anterior del cuello son de un blanco puro, pero el pecho es bermejo y está marcado de estrias negras dispuestas sobre la mitad de las plumas; los muslos, el abdomen y las coberteras de la cola son de un bermejo castaño muy vivo.

Halcon de cola bermeja.

Se da ese nombre, el de *Esmerejon color de plomo* de Azara ó *halconcillo plumbeo*, á la segunda variedad del Halcon anaranjado de Latham. Mr. Temminck, despues de establecer una comparacion, la distingue como especie. Es un ave que vive en el Brasil y en el Paraguay, aunque no es muy comun en esta última parte de América. Dícese que sigue á los viajeros por los campos, revoloteando en derredo