

pero es muy cobarde. Basta un Gavilan bien enseñado para acometerla y rendirla. (BUFF).

AGUILA CALZADA.

Falco pennatus (Bris).

Esta especie es de la Europa oriental, y se ha propagado á las regiones mas inmediatas de Asia y Africa. Su talla es muy inferior á la de las Aguilas comun é imperial, y sus tarsos dejan de estar emplumados un poco mas arriba de los dedos. En Sajonia, Hungría y Austria es donde mas particularmente vive esta ave, cuyas costumbres son poco conocidas. Su plumaje es bermeji-moreno con flámulas negras sobre el lomo, bermejo claro, blanquecino, con estrias morenuzcas sobre el vientre. Cuando jóvenes tienen mas moreno bermejizo sobre la cabeza y el cuello, y mas bermejo claro sobre las partes interiores: en todos los individuos se notan de ocho á diez plumas de un blanco puro situadas en la insercion de las alas. El macho tiene diez y siete pulgadas, con seis líneas de longitud, y la hembra diez y ocho.

Mr. Cuvier ha descrito, en una nota de su *Regne animal*, una especie que muy bien pudiera ser una repetición de la precedente.

AGUILA LADRONA.

Falco rapax (Tem.); *Aguila pequeña del cabo* (Cuv.)

Tiene mucha analogía con las Aguilas chillona y boneli; pero la fuerza de su pico casi es igual á la del Aguila comun; sus garras robustas contrastan con sus dedos cortos; y la pierna se halla cubierta de largas plumas que forman anchas calzas. El macho tiene el plumaje de color café con leche, morenuzco en el vientre y el tronco. La hembra tiene flámulas morenas, la cola barreada transversalmente de blanquecino, y con estrias blancas sobre las plumas del manto.

AGUILA ARMIGERA.

Aguila griffard.

Debemos el conocimiento de esta especie á la excursion de Levillant al país de los namaquenses. Vive casi exclusivamente en la Cafreria, y es notable por la blancura del plumaje que cubre la parte inferior del cuerpo mientras la superior parece atigrada, por la mezcla de blanco y moreno. Sin embargo, el lomo y las coberteras de la cola son de color moreno. No hay otra diferencia entre el macho y la hembra sino en la talla, pues la del macho es una tercera parte menor que la de la hembra. Esta raza vive por pares, que se posan en la cima de los árboles mayores, donde construyen su nido dándole la forma de tarima. La hembra pone dos huevos completamente blancos, que incuba con maternal solicitud.

Mientras que desempeña sus funciones de madre, atiende el macho á sus necesidades y á la de su progenie. Cuando estan encaramadas sobre algun árbol exhalan con frecuencia gritos agudos y penetrantes, chillidos roncós y lúgubres.

AGUILA MALAYA.

En la edad adulta tiene su plumaje enteramente de color de hollin, mas ó menos negruzco. Solo las plumas de la cola están manchadas con algunos lunares blanquecinos, de cuyo color están tambien rayadas las remeras. Esta Aguila se dedica á cazar otras aves, los reptiles y hasta algunos Insectos.

Vive ordinariamente en las islas de la Sonda, Sumatra y en la de Java con mas especialidad.

AGUILA AUSTRALIANA.

Falco fucosus (Cuv.)

Parece formar el tránsito de las Aguilas á los Pigargos, porque sus tarsos no están completamente vestidos. Su cola bastante larga, de color leonado y muy escaloneada forma una especie de cono. El color del plumaje es de un moreno negruzco, con matices de bermejo dorado bastante claro. La garganta y la parte anterior del cuello son de un moreno negruzco, la cabeza y la nuca de un precioso bermejo dorado. Su talla es de dos piés con seis pulgadas, y habita en la Nueva Holanda.

AGUILA INDIANA.

Se observó en las montañas de Vindhya, situadas entre Benarés y Guerrah Mundela, en la India continental. Su plumaje es moreno mas ó menos claro, pero la cabeza, el pecho, las remeras secundarias y la cola son siempre de un moreno negruzco. Esta tiene en su extremidad un orillo blanco que resalta mucho. Las plumas primarias son negras, y las de la cabeza y del cuello ligeramente lanceoladas y de un bermejo pálido.

AGUILA DE DOS RAYAS.

Aquila bifasciata.

Especie de la India representada en la Zoología indiana del general Hardwich. El iris es de un color de ocre amarillento, teñido de moreno. Los individuos jóvenes tienen un plumaje de colorido mas pálido que los adultos. El coronel Sgkis encontró el cuerpo de un raton, que habia sido tragado entero, en el estómago de este rapaz, que tiene veinte y ocho pulgadas de longitud, sin contar la cola, que llega á diez.

SUB-GÉNERO PIGARGO.

Haliætus (Savigny).

Los Pigargos han sido distinguidos de las verdaderas Aguilas por la sagacidad de Mr. Julio César Savigny, quien fija sus caracteres del siguiente modo: cera lisa, narices lunuladas y transversales, tarsos gruesos, desnudos y provistos de escamas; se alimentan de animales vivos ó muertos, y tambien comen inmundicias; algunos muestran mucha afición al pescado, y se les halla muy frecuentemente en las costas.

Buffon dice que los Pigargos y las Aguilas se diferencian: primero en la desnudez de las piernas: las Aguilas las tienen cubiertas hasta el talon; los Pigargos las tienen desnudas en toda la parte inferior; segundo, en el color del pico: el de las Aguilas es de un negro azulado, y los Pigargos lo tienen amarillo ó blanco: tercero, en la blancura de la cola, que le ha hecho llamar Aguila de cola blanca, porque la tiene efectivamente blanca por encima y por debajo, en toda su extension. Se diferencian aun de las Aguilas por algunas costumbres naturales. No habitan en los sitios desiertos, ni en las altas montañas; viven en las llanuras y los bosques inmediatos á sitios poblados. Parece que el Pigargo, lo mismo que el Aguila comun, prefiere los climas frios: se le encuentra en todos los países del Norte de Europa.

QUEBRANTA-HUESOS Ó SANGUAL.

Haliætus nisus (Sav.); *Aguila real marina*; *Falco albicilla et albicaudus* (Gm.)

A pesar de algunos lunares, la mejor descripción

Fco. Javier Mendivil