

sino que lo que nace de los Haliotos no son Haliotos sino Quebranta-huesos; de los que nacen, añade, pequeños Buitres, que producen otros grandes, que no tienen la facultad de engendrar. ¡Cuántos hechos increíbles encierra este párrafo! ¡Cuántos absurdos! Extendiendo todo lo que está permitido, ó es posible, á los límites de las variaciones de la naturaleza y dando á este párrafo la explicación menos favorable, suponemos por un momento que los Haliotos no sean efectivamente mas que mestizos procedentes de la union de dos distintas especies de Aguilas, serán fecundos como lo son los mestizos de algunas aves, y producirán entre ellos otros mestizos que podrán llegar á la especie del Quebranta-huesos, si la primera mezcla fue de este con otra Aguila. Nada hay en esto que sea contrario á las leyes de la naturaleza; pero decir que de esos Haliotos convertidos en Quebranta-huesos proceden pequeños Buitres, que producen otros grandes que nada producen, es añadir tres hechos absolutamente increíbles á dos que es muy difícil creer; y aunque en Plinio hay cosas escritas con sobrada ligereza, no me puedo persuadir que sea el autor de semejantes aserciones, y prefiero creer que el final de este párrafo ha sido tergiversado. Lo cierto es que los Sanguales nunca han producido buitres chicos, ni estos bastardos otros buitres grandes y estériles. Cada especie, cada casta de Buitres engendra su semejante, lo mismo que cada especie de Aguilas, de Haliotos y de Sanguales; y las especies intermedias que pueden haber resultado de la mezcla de las Aguilas entre sí, han formado castas perennes que se sostienen y perpetúan como las demás por medio de la generacion. Estamos muy seguros que el Halioto produce con su hembra hijos semejantes á él, y que si los Haliotos producen Sanguales no será por sí mismos, sino por su mezcla con el Sangual: resultaria de la union del Halioto macho con la hembra del Sangual, lo que resulta de la del macho Cabrio con la Oveja, un Cordero; porque la Oveja domina en la generacion, y resultaria de aquella mezcla un Sangual, porque las hembras son las que, generalmente hablando, dominan; de suerte que por lo comun los mestizos fecundos retrogradan á la especie de su madre y aun los verdaderos Mulos, es decir, los mestizos infecundos, representan mejor la especie de la hembra que la del macho.

Lo que hace creíble la posibilidad de la mezcla y producto del Halioto y del Sangual es la conformidad de los apetitos, de las naturalezas, y aun de la figura de estas aves; pues aunque se diferencian mucho en el tamaño, siendo el Sangual una mitad mas grueso que el Halioto, se asemejan bastante en las proporciones, teniendo ambos las alas y las piernas en comparación de la longitud de su cuerpo, la parte bajo de las piernas, y los pies desnudos de pluma: ambos tienen el vuelo menos elevado, y menos rápido que las Aguilas; ambos pescan mas que cazan y no habitan mas que en sitios inmediatos á lagunas y aguas abundantes de pesca; ambos son bastante comunes en Francia y en los demás países templados; pero el Sangual como mayor no pone mas que dos huevos, y el Halioto pone cuatro.

El Aguila de mar construye su nido en los robles mas elevados; nido de bastante extension, en el que no pone mas que dos huevos muy gordos, redondos, bastante pesados, y de color blanco sucio. Hace algunos años que se halló uno en el parque de Chambord; remití los dos huevos á Mr. Reaumur, pero no se pudo levantar el nido. El año pasado se cogió un nido en San Lorenzo de las Aguas en el bosque de Briou, en el que solo habia un Aguilucho que el maestro de postas hizo criar. Se ha matado en Bellegarde, en el bosque de Orleans, un Sangual que durante la noche pescaba los mejores Sollos de un estanque de la pertenencia del duque de Antin. Este tiene la piel que cubre el nacimiento del pico y los pies, por lo regular azules, y en

el Sangual esta piel y las escamas de la parte inferior de las piernas y los pies son regularmente de color amarillo oscuro. Tambien hay una gran diferencia en la distribución de los colores en la pluma; pero todas estas pequeñas diferencias no impiden que estas aves sean especies bastante inmediatas para poderse mezclar; y razones de analogía me hacen creer que la mezcla es fecunda, y que el Halioto mezclado con la hembra del Sangual, produce Sanguales y que la hembra del Halioto con el Sangual produce Haliotos, y que estos bastardos, bien sean Sanguales, ó Haliotos, teniendo casi todo de la naturaleza de su madre, solo conservan algunos caracteres de la de sus padres, que les distingue de los Sanguales ó de los Haliotos legítimos. Por ejemplo, algunas veces se hallan Haliotos con pies amarillos, y Sanguales que los tienen azules, aunque generalmente aquellos los tienen azules y estos amarillos.

Como esta ave es de las mas grandes y por esta razon produce tan poco que solo pone dos huevos una vez al año, y muchas veces no cria mas que un hijo, la especie no abunda en ninguna parte, pero está bastante propagada: se encuentra en Francia en casi todos los parajes, y aun parece que es comun á ambos continentes, y que estas aves frecuentan los lagos de la América septentrional.

AGUILA-BUITRE.

Choka (Smit.); *Falco vulturinus* (Schaw.); *Gypaetus cafer* (Temm.); *Cufre* (Less.); *Aguila de verreux*; *Haliætus vulturinus* (Less.)

Vive en los picos mas escarpados de las montañas del cabo de Buena Esperanza, donde se alimenta principalmente de Damanes y hasta de cadáveres corrompidos: como los Buitres, siempre anda á pares y no tiene las costumbres de las demás Aguilas.

El pico es azulado-plomizo; la cera y los dedos son amarillos, y las uñas morenas. Las plumas de la cabeza son angostas, ligeramente rígidas, y el cerco de los ojos está desnudo. Un negro lustroso é intenso colorea la cabeza, el cuello, la parte superior del cuerpo y todas las inferiores; en una palabra, es general un negro intenso, sobre el cual se destaca haciéndolo mas perceptible el color blanco níveo que reina sobre el lomo, la rabadilla y las coberteras superiores de la cola.

Las alas, cuyas remeras son vigorosas y encorvadas, presentan el color negro; pero las plumas escapulares superiores son blancas y las pennas primitivas y bastardas son de un gris bermejizo rayadas al través por estrias de este último color con tinta mucho mas oscura; las timoneras rígidas y amplias dan á la cola una forma algo redondeada, á cuya extremidad no llegan las alas exactamente son negras y están rayadas transversalmente por debajo. Las plumas vellosas que cubren los tarsos hasta los dedos son igualmente morenas.

Aun cuando consideramos al *Cafre* como idéntico al Aguila *Verreux*, segun las observaciones hechas en el Cabo por Mr. Smich, debemos añadir que Levaillant, observador no menos exacto y minucioso, no habla del lomo blanco del Cafre, y por el contrario dice categóricamente «que todo su plumaje es de un negro mate.» Además, todo lo que refiere de los hábitos de este Cafre no se halla en armonía con las formas del Aguila *verreux*.

BLAGRO.

Haliætus ó *Falco blagrus* (Less. y Dau.); *Aguila occedonica* (Tem.)

Habita en la extremidad austral del Africa, en las costas meridionales de la Nueva Holanda y algunas islas de la Oceanía.

Fco. Javier Mendivil