

tes inferiores del macho están cubiertas de fajas transversales muy angostas dispuestas sobre un fondo mas ó menos blanquecino : dichas fajas, que son bermejo-rojizas, distan mas entre sí sobre las partes abdominales, hasta llegar al cuello y el pecho donde están dibujadas con menos regularidad.

La hembra difiere del macho en que las fajas están débilmente marcadas y en que el color bermejo se halla dispuesto por grandes masas. La garganta y la parte anterior del cuello están coloradas por una tinta bermejo-rojizo clara; el pecho es mas oscuro; el vientre está ondulado y débilmente rayado de bermejo y de blanco, y los muslos así como el abdomen son de un blanco ligeramente teñido de rojizo. Los individuos que todavía no están adornados con el plumaje completo ó de colores notables, tienen el collar de la nuca dibujado con menos limpieza : el color ceniciento del lomo y de las alas está teñido de rojizo, ó bien marcado de zonas morenas, y mezclado algunas veces de manchas morenas y rojizas: las fajas transversales de las alas y la cola son mas distintas; las coberteras de debajo de las alas están rayadas de bermejo y blanco; la cola por su reverso es blanquecina y está rayada de moreno; la garganta se vé marcada de pequeñas zonas y de manchas dispuestas sobre un fondo ceniciento; el pico y las uñas tienen un color negro, y la cera y los piés son de un amarillo puro. Longitud total desde catorce pulgadas con seis líneas hasta quince ó diez y seis pulgadas.

Los jóvenes de un año tienen un gran número de fajas morenas en la cola y debajo de las pennas de las alas; todo el plumaje es moreno, mezclado y manchado de bermejo, el collar de la nuca está rayado longitudinalmente, y del mismo modo lo está la garganta; las demás partes inferiores tienen rayas transversales anchas é irregulares.

No solamente existe esta ave en la Nueva Holanda, sino tambien en Timor y algunas de las demás islas Molucas.

GAVILAN GABAR.

Ha sido descubierto por Levaillant en el cabo de Buena Esperanza, y se halla en el Senegal, sobre la costa occidental de Africa.

Su talla iguala á la del Gavilan; pero no es tan largo por ser su cola algo mas corta.

Toda la parte superior del cuerpo, la cabeza y las mejillas son de un gris moreno mas oscuro que el manto y el occipucio; tanto las coberteras de encima como las de debajo de la cola, son blancas; las grandes pennas de las alas son morenas en todas las partes visibles á primera inspeccion; cuando están plegadas muestran por el reverso fajas transversales y las del medio terminan en blanco; la cola, cuyo recorte es cuadrado, está por encima barrada de moreno oscuro sobre un fondo mas claro, y por debajo es blanca y esta lavada de negro. La garganta y el pecho son de un gris azulado. Todo lo demás del cuerpo, del mismo modo que las piernas, que están muy emplumadas, ostentan un listado de un moreno nada oscuro, sobre un fondo blanquecino. Los ojos son de un amarillo vivo; las garras y el pico de color negro; la base de este último, así como los piés, son de un precioso color rojo.

La hembra del Gabar es una tercera parte mayor que el macho; tiene los piés y la base del pico de un rojo menos vivo; en la estacion de las lluvias, el macho pierde una parte de su color rojo. En el mes de setiembre incuba el Gabar que hace su nido entre las ramas de una grande especie de sensitiva; lo construye con raices de varias plantas, é interiormente lo guarnece de plumas. En uno de estos nidos vió Levaillant tres hijuelos tan grandes como los mismos padres, y echaron á volar en cuanto aquel se apro-

ximó; pero despues de haber matado á estos últimos se apoderó de los pequeñuelos, que tenían amarillos los piés del mismo modo que la base del pico. El pecho y el manto ostentaban algunas plumas morenas, otras enteramente azuladas, otras por último eran de todo punto bermejas, y tres de ellas reunian á la vez estos tres colores. Toda la parte inferior del cuerpo estaba rayada de leonado, sobre un fondo blanco sucio de un tinte rojizo. Al visitar el nido, todavía halló un huevo muy sucio, aunque despues de lavarlo, quedó blanco. Por lo mismo, es muy probable que la postura sea generalmente de cuatro huevos, y estos de color blanco, porque Levaillant ninguna mancha descubrió sobre el que quedara rezagado, que era tan grande como los de nuestro Gavilan europeo.

Levaillant solo ha visto al Gabar tierra adentro, no muy distante de los rios *Sewarte-Kop* y *Sondag*, bien así como en el *Karow*, el *Camdeboo*, y por último, casi en la totalidad del terreno que este viajero atravesó en las montañas de nieve que se hallan en *Bocke-Veld*; pero nunca le pudo descubrir en las inmediaciones del Cabo. Es no obstante muy probable que se extienda á mayor distancia, puesto que como las aves Carnívoras se aíslan mas obstinadamente que las otras, es muy natural que sus especies se diseminan en razon de este instinto natural que á cada pareja le mueve á elegir una comarca exclusiva para atender á sus necesidades. Como la propagacion en los animales Carnívoros de un órden superior es mucho mas considerable que la de las grandes especies, se deduce muy naturalmente que cada una de ellas debe de ocupar un terreno proporcionado al mayor ó menor número de individuos que la componen.

Mr. Temminck le da por patria la Cafrería, la Gambia y el Senegal.

DIMINUTO.

Falco minullus (Dau.)

Levaillant lo ha descubierto en Africa, y lo describe en los términos siguientes: «Un pequeñísimo Gavilan de Africa, el menor sin duda entre todas las aves de Rapiña de este género, mas chico todavía que nuestro Esmerejon, es el que se conoce con el nombre de *Diminuto*. Reconócense en esta especie las dimensiones proporcionales del Gavilan comun de Europa, aunque su magnitud es inferior á la de su modelo; los tarsos son muy largos y tambien es larga su pierna; la extremidad de las alas apenas se extiende mas allá del nacimiento de la cola, cuyo corte es cuadrado; la primera penna del ala es mas corta que la cuarta: todos estos caracteres convienen igualmente al Diminuto y á nuestro Gavilan, y sirven para diferenciarle del Esmerejon, con el cual pudiera confundirse por algunas leves analogías.

Todas las plumas que cubren la parte superior del cuerpo son de un color moreno, al menos en toda la parte visible, cuando están acostadas ó sobrepuestas, pero interiormente se ven manchadas de blanco; su garganta es blanca con algunas pequeñas manchas morenas sobre la mitad de cada pluma; el pecho es del mismo color, pero las manchas que en él se descubren se hacen mayores á medida que se extienden mas abajo y son de la forma de una hoja de cuchillo con la punta hácia arriba.

Obsérvanse en la parte inferior del bajo-ventre varias manchas mas ó menos redondas sobre un fondo blanquecino; debajo de la cola estas manchas adquieren la figura de un corazon: los costados y las plumas de las piernas ostentan rayas de un moreno claro, extendidas con regularidad; las grandes pennas son morenas exteriormente, y están rayadas de blanco sobre sus barbas interiores; las del medio lo están en el mismo sentido, pero el blanco es mas cándido y las